

Памятка по профилактике Африканской чумы свиней

Африканская чума свиней опасность для человека не представляет, но все же следует избегать контактов с зараженными животными, так как вирус постоянно мутирует, и невозможно предсказать его дальнейшее поведение. Человек может быть механическим переносчиком вируса. Также переносчиками могут стать домашние и дикие животные, кожные паразиты, грызуны. Конечно же, заболевшие свиньи представляют угрозу здоровым только в том случае, если они находились с ними в контакте. Африканской чумой заболевают не только домашние свиньи, но и дикие. Вспыхнуть заболевание может из-за вирусоносителя или больного животного. Заболевание может распространяться также через корма, пастбища и помещения, в которых находились больные или носители вируса. Опасными являются и не обезвреженные отходы.

Симптомы заболевания

Заболевание может протекать в нескольких формах: стремительная; острая; подострая; хроническая. При молниеносном течении животное погибает в первые сутки заболевания. При этом отмечается сильная слабость, тяжелое дыхание и высокая температура тела до 42 градусов. При острой форме, а также подострой и очень редко хронической наблюдаются такие симптомы: поднимается температура до 40,5-42 градусов; рвота; затруднено дыхание; наступает паралич задних конечностей; испражнения с кровью или запор; слабость; повышенная жажда; в области шеи появляются буро-фиолетовые пятна. Различие только в продолжительности течения, так острая форма длится до 7 дней, подострая до 20. Как правило, риск смертности от 50% до 100%. Если животное выздоравливает, то является носителем этого опасного вируса. Задача состоит в том, чтобы не дать вирусу распространиться, поэтому, если чума зафиксирована, все поголовье в эпицентре необходимо уничтожить бескровным способом. Зола при этом смешивается с известью и закапывается. Также необходимо уничтожить предметы, использованные при уходе за скотом, корм. Прилегающие территории и свинофермы обрабатывают горячим 3% раствором щелочи и 2% раствором формальдегида. Объявляется карантин на полгода. Помещения нельзя использовать в течение года после карантина.

Профилактика чумы

- Своевременно проводить вакцинацию свиней от классической чумы и рожи;
- не допускать свободного выпаса животных, держать следует на огражденной площади;
- проводить санацию помещения, где содержатся животные, несколько раз в месяц;
- бороться с грызунами, так как они являются переносчиками вируса;
- если кормить свиней отходами животного происхождения, необходимо обрабатывать их при температуре не ниже 70 градусов, затем добавлять в корм;
- не приобретать свиней, не проверенных Государственной ветслужбой;

-при любом заболевании или подозрении на вирус срочно обращаться в ветеринарную службу.